

# 周口广灵驴养殖厂

生成日期: 2025-10-23

一般驴群100头~200头分为一群。如驴群不大,也可混群放牧,但公畜要单独管理和放牧,以免影响母畜采食或造成劣种遗传。分区轮牧,阶段调整分区轮牧就是把草地按计划分成小区,秋季放牧,一般划分五个小区,每区放牧6天,轮流两次,共为60天。每个小区只放牧5天~6天,就轮流到下一个小区草地。因为牧草还处于生长期,再生能力强,这样可延长放牧时间,对草地的作用和保护草地的再生都有利,驴也吃得好,吃得饱,可避免草地的过度利用及践踏,也是保护草场和防止退化的一个好法子。很多朋友加入养驴行业。周口广灵驴养殖厂

肉驴养殖场在选择场址和建造驴场,要按要求进行生产区、管理区、生活区的规划,做好定期消毒防疫。养驴场消毒是采用物理、化学、生物学手段杀灭或抑制生产环境中病原体的一项技术措施,其目的在于消灭传染源,切断传播途径,防止传染性疾病的发生与流行,是综合防疫措施中常采用的一项重要措施之一。定期对栏舍、道路,驴群进行消毒;产前对产房、临产母驴及新生驴驹脐带断端消毒;人员、车辆出入生产区时要消毒;饲料、饮水及使用的医疗器械要消毒;当驴群中有个别个体发生疫病或突然死亡时要消毒;大群发生烈性传染病的初期及疫病流行平息后要大消毒等。周口广灵驴养殖厂肉驴养殖管理不同,出栏时间也不同。

驴虽然适口性好,但是不是什么东西吃,另外毛驴的直肠动物不是反刍动物不要拿养牛的方式养驴,驴喜欢有活动场地,牛没有场地吃饱了就趴在可以,但是驴不行,不然和容易得结症。很多农作物秸秆基本都比较适口但是长度一定不太大,也不要太硬。也不要被电视信息蒙蔽了双眼,不是路边草就随便可以吃,现在注重出肉率,你喂的越好生长就越快。有的人不喂精料,你养驴是干什么的,如果是玩那完全可以喂点草让它活着就行,但是如果你想着赚钱就必须注重饲料搭配的问题,精料必须要,不要怕吃,驴吃不算多没牛吃的多。

结核病是一种慢性的共患传染病,其特点是渐进性消瘦、在多种组织形成结核结节,继而结节中心干酪样坏死或钙化。本病不仅古老,而且分布很广,世界各地都有发生,驴是家畜中\*\*易感的动物,特别是奶驴,其次是水驴。结核在鹿多发生于梅花鹿、驴鹿、驯鹿和黑鹿。不同牧场鹿群中结核发病率可达8~16。国内调查有的鹿场梅花鹿中的结核菌素阳性率高达80以上。世界动物卫生组织(OIE)规定,结核病必须强制报告。有报道称,2002年度结核病是引起我国公民死亡多的5种传染病之一。驴肉不但是绿色的肉类食品,而且具有较高的营养。

当肉驴达到育肥标准时,就要及时进行宰杀,因此时屠宰率比较高。过了催肥期,肉驴增长缓慢,饲料报酬下降,料肉比降低。肉驴屠宰前1天要光饮水不给料,让肉驴处于绝食状态,这样不但可以提高肉驴的肉质,而且还可以节省饲料和屠宰时间。一般育肥要求杂种和非杂种小驴驹6月龄断奶转入育肥期后,枯草期6个月除放牧外,日均补精料1公斤,用时补喂干草6公斤。进入第2年青年期,前4个月全放牧不补饲,两个月日补精料1.5公斤,粗料不限量。全育肥期12个月,共用精料270公斤,体重可达200公以上。必须采用科学的管理技术,提高日增重和饲料利用率。周口广灵驴养殖厂

适应性极好,抗病力很强,很少有疾病。周口广灵驴养殖厂

做好肉驴日常管理1,温度要求:肉驴育肥期间,要注意舍内保持常温。天冷时要采取适当的保温措施,并尽量让驴多晒太阳,避免因御寒过多消耗体能;天热时及时适当降温,加强通风,以防中暑或食欲减退。2、适当运动:肉驴育肥期间,每天要保证肉驴有1小时左右的运动时间。遇上雨雪天,可在有遮阳棚的围栏内做轻微

运动。3、每天刷拭驴体：每天对肉驴进行1-2次身体刷拭。刷拭驴体，可刺激皮肤促进血液循环，增强体表运动，又可驱除虱、螨等体外寄生虫，促进体表健康。4、卫生管理与消毒：驴舍、. 饲槽、水槽每日清扫、测洗干净；驴舍粪便要每天定时清理，保持驴舍清洁卫生；每隔10-15天用3%的来苏儿进行消毒驴舍一次，以防疾病发生。周口广灵驴养殖厂

上蔡县润康牧业有限公司致力于农业，是一家生产型的公司。公司业务分为驴，马，牛，羊等，目前不断进行创新和服务改进，为客户提供良好的产品和服务。公司将不断增强企业重点竞争力，努力学习行业知识，遵守行业规范，植根于农业行业的发展。润康牧业秉承“客户为尊、服务为荣、创意为先、技术为实”的经营理念，全力打造公司的重点竞争力。